

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS II – AREIA-PB CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA

EMMANUEL JOSÉ FIALHO CAMILO

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE RAÇÕES COMERCIAIS PARA CÃES E GATOS, VENDIDAS A GRANEL, NO AGRESTE PARAIBANO

AREIA

EMMANUEL JOSÉ FIALHO CAMILO

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE RAÇÕES COMERCIAIS PARA CÃES E GATOS, VENDIDAS A GRANEL, NO AGRESTE PARAIBANO

Trabalho de Conclus ão de Curso apresentado como requisito parcial à obten ção do t fulo de Bacharel em Medicina Veterin ária pela Universidade Federal da Para ba.

Orientador: Prof °. Dr °. Felipe Nael Seixas.

AREIA

Catalogação na publicação Seção de Catalogação e Classificação

A663a Araújo, Eros Jofily Fernandes Soares.

Achados histopatológicos em linfonodos pulmonares de

bovinos destinados ao abate em matadouros nas regiões do Brejo e Curimataú paraibano / Eros Jofily Fernandes Soares Araújo. - Areia, 2019. 40 f.: il.

Monografia (Graduação) - UFPB/CCA.

1. Inspeção. 2. Necropsia. 3. Saúde Pública. I. Título

UFPB/CCA-AREIA

EMMANUEL JOSÉ FIALHO CAMILO

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE RAÇÕES COMERCIAIS PARA CÃES E GATOS, VENDIDAS A GRANEL, NO AGRESTE PARAÍBANO

	Trabalho de Conclus ão de Curso apresen como requisito parcial à obten ção do t ful Bacharel em Medicina Veterin ária Universidade Federal da Para ba.	lo de
Aprovado em://		
	BANCA EXAMINADORA	
	Droft Dru Foling Noel Saives	
	Profº. Drº. Felipe Nael Seixas Universidade Federal da Paraíba (UFPB)	
_	Prof ^a . Dr ^a . Bruna Agy Loureiro	
	Universidade Federal da Paraíba (UFPB)	
-	Dr0 Folisio Coring lunior	
	Drº. Felicio Garino Junior Bi dogo	
	Dialogo	

A meus pais, pelo amor, paci ência e por tudo aquilo que constru mos e vamos construir, DEDICO.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agrade ço a meus pais por tudo que fizeram e fazem por mim, por terem me dado a oportunidade de estudar durante toda a minha vida e durante o curso de gradua ção, por terem me ajudado em momentos dif ceis e quando estive doente, por serem tudo o que são e representam para mim. Nada teria sido poss vel sem a presen ça deles.

Agrade ço ao Prof °. Dr °. Felipe Nael Seixas, por toda ajuda e ensinamentos passados durante a gradua ção, pela paciência e orienta ção durante a realiza ção dos experimentos do TCC.

Aos professores que se mostraram exemplos de profissionais, seja lecionando ou exercendo atividade em suas áreas, mas acima de tudo, atuando como verdadeiros educadores, contribuindo para a formação moral e profissional, tendo valores, ética e respeito.

Agrade ço aos funcion ários do Hospital Veterin ário do Campus II da UFPB, por toda ajuda concedida durante todos os meus est ágios e experimentos, pelas práticas e conhecimentos que foram transmitidos e ajudaram no processo de realiza ção deste trabalho de conclus ão de curso.

Aos residentes do Hospital Veterinário, pelos ensinamentos durante a prática clínica e laboratorial, pelas conversas e momentos de descontração e pela ajuda e paciência durante a realização do TCC.

Aos meus animais, por todo o companheirismo e amor, pelas horas de conversa e de estudos e por me ajudarem atéhoje nos momentos de estresse.

Aos meus amigos, por todas as ajudas em momentos ruins com ouvidos e braços sempre àpostos, pelos momentos de divers ão, companheirismo, pelas idas às praças e cachoeiras, pela ajuda durante a realização do TCC e por todos os momentos bons que ainda ir ão vir.

"Can I ask a question? The right thing, what is it? I wonder if you do the right thing, does it really make everyone happy? Your true face, what kind of face is it? I wonder, the face under the mask, is that your true face?"

Children on the Moon, The Legend of Zelda: Majora's Mask

RESUMO

A linha de produção de rações secas para animais de companhia ébastante extensa e, apesar do mercado pet se apresentar em constante crescimento, sofre pela falta de uma legislação espec fica capaz de controlar de forma adequada a produção e venda de rações. As rações vendidas a granel são as mais prop éias a apresentarem contaminantes, visto sua exposição. Foram coletadas e analisadas 21 amostras (cada uma com 200-300g), de 10 cidades diferentes, em duplicata e série de 3 tubos, de rações secas para animais de companhia, 20 vendidas a granel e um em saco fechado. Foram realizadas contagem total de mesófilos aerófilos, contagem total de leveduras e bolores e foram determinados os números mais prováveis de coliformes totais e termotolerantes. Nos resultados foi observada presença de crescimento na maioria das amostras testadas para mesófilos aerófilos, leveduras e bolores, o que indicou contaminação bacteriana e fúngicas das amostras. Nas provas de coliformes realizadas seis amostras reagiram nos tubos das diluições de 10-! Recomenda-se a elaboração de uma legislação adequada para a produção de rações, bem como novos métodos de armazenagem da ração vendida a granel para preservar a qualidade microbiológica e nutricional do alimento.

Palavras-chave: Avaliação, microbiologia, qualidade, pet, higiene.

ABSTRACT

The production line of dry ration for company animals is so long and, although the pet market is constantly growing, suffers from the lack of specific legislation capable of adequately controlling the production and sale of dry ration. Rations sold in bulk are the most likely to present contaminants, once their exposure. Twenty one samples (each with 200-300g) of 10 different cities, in duplicate and series of 3 tubes, of dry petfood (20 sold in bulk and 1 in a closet bag) were collected and analyzed. Total counts of aerophilic mesophiles, total yeast and mold counts were determined and the most probable numbers of total and thermotolerant coliforms were determined. In the results, growth was observed in most of the samples tested for aerophilic mesophiles, yeasts and molds, indicating bacterial and fungal contamination of the samples. In the coliform tests six samples were reacted in the 10-1 dilution tubes. It is recommended to develop adequate legislation for the production of dry ration for company animals as well as new methods of storing the ration sold in bulk to preserve the microbiological and nutritional quality of the ration.

Keyword: Evaluation, microbiology, quality, pet, hygiene.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 -	Porcentagem total de amostras positivas para mes ófilos aer ófilos, leveduras e	
	bolores, coliformes totais e coliformes termotolerantes	(

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 -	Limites para contaminantes microbiológicos segundo normas do MAPA e manual ABINPET.	16
Tabela 2 -	Resultados microbiológicos das contagens de mesófilos aerófilos, fungos e bolores e do crescimento de coliformes totais e termotolerantes.	17
Tabela 3 -	Datas de validade, segmento comercial e espécie indicada pela ração	18

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

%: porcentagem

g: gramas

Kg: quiilogramas

PCA: Ágar Padr ão para Contagem

SAB: Ágar Sabourand

LST: Caldo Lauril Sulfato Triptose

VB: Caldo Verde Brilhante

EC: Caldo Escherichia Coli

NMP/g: N úmero Mais Prov ável por grama

UFC/g: Unidades Formadoras de Col ônia por grama

C: Graus Celsius

ml: mililitro

SP: Super-premium

MAPA: Minist ério da Agricultura, Pecu ária e Abastecimento

ABINPET: Associa ção Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estima ção

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	13
2.	MATERIAIS E MÉTODOS	14
3.	RESULTADOS E DISCUSSÕES	15
4.	CONCLUSÕES	20
5.	REFERÊNCIAS	21
6.	ANEXO 1	23

O trabalho de conclus ão de curso est ásendo apresentado em forma de artigo segundo as normas da Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal - Brazilian Journal of Hygiene and Animal Sanity (Anexo 1).

An álise microbiol ógica de ra ções comerciais para c ães e gatos, vendidas a granel, no Agreste paraibano

Microbiological analysis of commercial diets for dogs and cats, sold in bulk, in interior of Para ba Emmanuel Jos éFialho Camilo ¹, Felipe Nael Seixas ³

Resumo: A linha de produção de rações secas para animais de companhia é bastante extensa e, apesar do mercado pet se apresentar em constante crescimento, sofre pela falta de uma legislação espec fica capaz de controlar de forma adequada a produção e venda de rações. As rações vendidas a granel são as mais prop é ias a apresentarem contaminantes, visto sua exposição. Foram coletadas e analisadas 21 amostras (cada uma com 200-300g), de 10 cidades diferentes, em duplicata e série de 3 tubos, de rações secas para animais de companhia, 20 vendidas a granel e um em saco fechado. Foram realizadas contagem total de mes ófilos aer ófilos, contagem total de leveduras e bolores e foram determinados os números mais prováveis de coliformes totais e termotolerantes. Nos resultados foi observada presença de crescimento na maioria das amostras testadas para mes ófilos aer ófilos, leveduras e bolores, o que indicou contaminação bacteriana e fúngicas das amostras. Nas provas de coliformes realizadas seis amostras reagiram nos tubos das diluições de 10-! Recomenda-se a elaboração de uma legislação adequada para a produção de rações, bem como novos métodos de armazenagem da ração vendida a granel para preservar a qualidade microbiológica e nutricional do alimento.

Palavras-chave: Avalia ção, microbiologia, qualidade, pet, higiene.

Abstract

The production line of dry ration for company animals is so long and, although the pet market is constantly growing, suffers from the lack of specific legislation capable of adequately controlling the production and sale of dry ration. Rations sold in bulk are the most likely to present contaminants, once their exposure. Twenty one samples (each with 200-300g) of 10 different cities, in duplicate and series of 3 tubes, of dry petfood (20 sold in bulk and one in a closet bag) were collected and analyzed. Total counts of aerophilic mesophiles, total yeast and mold counts were determined and the most probable numbers of total and thermotolerant coliforms were determined. In the results, growth was observed in most of the samples tested for aerophilic mesophiles, yeasts and molds, indicating bacterial and fungal contamination of the samples. In the coliform tests six samples were reacted in the 10-1 dilution tubes. It is recommended to develop adequate legislation for the production of dry ration for company animals as well as new methods of storing the ration sold in bulk to preserve the microbiological and nutritional quality of the ration.

Keyword: Evaluation, microbiology, quality, pet, hygiene.

INTRODUCÃO

A relação dos homens com os cães e gatos vem se desenvolvendo mais nos últimos anos, por ém acompanha o desenvolvimento da sociedade humana. Essa relação envolve diversos fatores (companhia, caça, segurança) e gera interações positivas tanto para o homem quanto para o animal.

O mercado de animais de estima ção tem se difundido cada vez mais dentre todas as classes sociais. V ários setores desse mercado, incluindo o de alimentos, vem ganhando mais espa ço nas prateleiras e tamb ém no consult ório de m édicos veterin ários.

O crescimento do v ínculo humano-animal tem impulsionado a preocupa ção com o bemestar animal, principalmente dos animais de companhia, bem como com a qualidade e seguran ça dos alimentos destinados a estes animais (HILLMANN, 2015).

O setor aliment cio éprodutor de mercadorias muito comercializadas dentro do mercado pet, como ossos comest veis, petiscos, ra ções secas e úmidas. Todos os setores do mercado pet vêm em constante crescimento nos últimos anos, segundo dados da ABINPET (Associa ção Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estima ção), em 2011 cresceu cerca de 13% (onde o seguimento pet food faturou 66% do total) quando comparado a 2010, em 2015 houve aumento de 7,6% comparando com 2014. Em 2017 o Brasil fechou o ano como o segundo maior mercado pet e com a quarta maior popula ção de animais de estima ção do mundo (ABINPET, 2017).

As rações secas s ão, atualmente, o principal alimento disponibilizado para c ães e gatos, estas geralmente s ão comercializadas em embalagens, variando entre 500 g e 25 kgs, mas tamb ém podem ser vendidas a granel, em saco aberto previamente, com a ração armazenada no próprio saco ou em outros recipientes. A venda das rações a granel acaba competindo com a comercialização de pacotes lacrados nos mesmos estabelecimentos, uma vez que oferecem certas vantagens ao comerciante e aos consumidores, tais como: menor preço de compra pelos estabelecimentos e um repasse com menor valor para a população, aumentando as vendas e lucro para os locais de venda (CAPPELLI et al., 2016).

O fato da venda a granel das rações ser mais barata é relativo, visto que o pre ço do quilograma (kg) nas rações em saco fechado varia de acordo com a quantidade de ração, podendo este chegar em pre ços mais baixos quando adquiridas embalagens maiores.

Essas rações s ão classificadas de acordo com o seu segmento comercial em econ ômicas, standart, premium e super-premium, onde as super-premium s ão consideradas as melhores nesse aspecto. No mercado é poss ível encontrar tamb ém denominações que se enquadram dentro das classificações acima, como premium especial e high premium.

Segundo Andrade & Nascimento (2005), um dos fatores que levam risco à sa úde dos animais se refere à contamina ção dos alimentos por fungos e outros microrganismos. Essa contamina ção pode ocorrer desde a produ ção e o armazenamento da mat éria-prima de origem animal e de grãos, que são amplamente utilizados na fabrica ção de ra ções para v árias esp écies animais, at é a industrializa ção e embalagem do produto final (SILVA, 1998).

O tratamento térmico realizado durante o processo de produção das rações secas extrusadas pode atingir temperaturas superiores a 150 °C, sendo esta maior do que as utilizadas para esterilização comum. Por isso, age como importante recurso para diminuir a incidência de

fungos e bact érias, bem como para reduzir a atividade em água, este importante para limitar o crescimento posterior de microrganismos (GIRIO, 2007). A adi ção de antif úngico realizada nas ra ções tamb ém é um importante fator na manuten ção da esterilidade dentro das embalagens.

Embora o produto passe por esse processamento térmico, falhas nas boas práticas de fabrica ção, da empresa ou do operador, podem abrir espa ço para a perda da esterilidade do produto (AMERICANO, 2016). A contamina ção tamb ém pode ocorrer em etapas seguintes do processo, como na pulveriza ção por gordura, secagem, empacotamento e armazenamento (SILVA, 2011).

Outra etapa onde pode ocorrer a contamina ção das ra ções é na venda, como em sacos rasgados ou na venda a granel. As ra ções vendidas a granel permanecem expostas ao ambiente, podendo diminuir a efic ácia das t énicas aplicadas para garantir sua esterilidade. A veicula ção de agentes por vetores como insetos e roedores tamb én éfacilitada com a exposi ção das ra ções. (GIRIO, 2007)

Visto que os microrganismos se multiplicam facilmente e que as rações, al ém de serem fonte de nutrientes para a proliferação desses, ainda podem estar sendo contaminadas em v árias fases do processamento e tamb ém da comercialização, faz-se necess ário avaliar a qualidade das rações por meio das an álises de mes ófilos aer ófilos, leveduras e bolores, coliformes totais e termotolerantes (fecais).

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram coletadas 21 amostras de ra ções secas com validade entre setembro de 2018 e janeiro de 2020, 20 vendidas a granel e uma de um saco fechado (amostra controle), de 12 marcas diferentes, vendidas a granel em lojas veterin árias (pet shop, casa de ra ção, cl nica) e mercados, cada uma contendo entre 200 e 300 gramas. As amostras foram coletadas em 20 estabelecimentos diferentes (10 do setor veterin ário e 10 de mercados), em 10 cidades diferentes do brejo paraibano, sendo elas: Bananeiras; Sol ânea; Arara; Pil ões; Areia; Rem gio; Esperan ça; São Sebasti ão de Lagoa de Ro ça; Lagoa Seca e Campina Grande. Das amostras coletadas 11 eram ra ções para c ães (adultos e filhotes) e 10 eram ra ções para gatos (adultos e filhotes), sendo analisadas ra ções econ ômicas, premium e super-premium, armazenadas para venda em sacos abertos, fechados, baldes de pl ástico, tubos de papel ão e em estantes com caixotes de madeira (com o saco dentro ou a ra ção solta dentro). As amostras eram coletadas com instrumento do local, de uso espec fico para as ra ções, e acondicionados em sacos "zip lock" est éreis, posteriormente foram armazenadas refrigeradas a 8-12 °C, durante, no máximo, sete dias.

As an alises de coliformes totais, termotolerantes, mes ófilos aer ófilos, leveduras e bolores foram realizadas no laborat ório de Medicina Veterin ária Preventiva, do Hospital Veterin ário, da Universidade Federal da Para ba, campus II. O laborat ório detinha os instrumentos necess ários para realiza ção das an alises. Os estabelecimentos onde foram coletadas as ra ções foram avaliados quanto as condi ções de venda das ra ções, sendo analisados visualmente os recipientes onde eram alocadas, o ambiente interno do local e o atendimento, quanto a higiene, infraestrutura, organiza ção.

Foram pesadas 25g de cada amostra e macerados, manualmente (com aux fio de "zip lock" est éril), com adi ção de 225ml de água peptonada a 0,1% est éril, formando a dilui ção 10- ! Posteriormente foram realizadas sucessivas dilui ções, 10- ? 10- 3e 10-4.

As diluições foram passadas para os meios e analisadas de acordo com a metodologia descrita por Silva (1997).

No PCA (Ágar Padr ão para Contagem), as placas foram incubadas a 37 °C, durante 48 horas, para o crescimento de mes ófilos aer ófilos.

No SAB (Ágar Sabourand acrescido de gentamicina), as placas foram incubadas a $24 \, ^{\circ}$ C, durante sete dias, para crescimento de leveduras e bolores.

No caldo LST (Lauril-Sulfato-Triptose), os tubos foram incubados a 37 °C, durante 48, para triagem de coliformes.

No caldo VB (Verde-Brilhante), os tubos foram incubados a 37 °C, durante 48 horas, para o crescimento de coliformes totais. No caldo EC (*Escherichia Coli*), os tubos foram incubados a 42 °C, durante 48 horas, para o crescimento de coliformes termotolerantes. Foi utilizada a tabela contida na Instrução Normativa n °62 do Ministério da Agricultura, Pecu ária e Abastecimento (MAPA, 2003), para interpretar o resultado dos testes e determinar o Número Mais Prov ável de coliformes totais e coliformes termotolerantes por grama de ração.

Para todos os testes citados foram realizados controles negativos. Ap ós passar o per ódo de incuba ção descrito, foram coletados os resultados obtidos nas placas e tubos. Os dados obtidos foram tabulados, foi utilizada a estat ática descritiva para an álise e interpreta ção dos dados e auxiliar no desenvolvimento e exposi ção dos resultados e discuss ões.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na an álise realizada na amostra controle n ão houve crescimento de mes ófilos aer ófilos e nem de bolores e leveduras, nos seus respectivos meios padronizados para o experimento. A amostra controle tamb ém n ão se mostrou positiva na triagem para coliformes.

Dos estabelecimentos visitados todos apresentavam venda de ração a granel e em saco fechado, não priorizavam a venda de nenhum dos tipos de ração (durante o atendimento), por ém o preço das rações vendidas em saco fechado era maior em 90% dos com ércios visitados (quando comparados preços referente a 1 kg). Observou-se animais em 65% dos locais visitados, e em 70% destes, o número de espécies era maior que um.

A venda fracionada das rações segue regulamento da Lei N °6198, de 26 de dezembro de 1974 (BRASIL, 1974). A mesma fala sobre o credenciamento dos estabelecimentos, levando em consideração aspectos de infraestrutura e organização; sobre a fiscalização, sendo realizadas visitas, coletas e an álises laboratoriais para verificar a qualidade da ração; sobre a utilização de boas práticas de higiene durante o armazenamento e a venda; dentre outros fatores. Essa fiscalização deve ocorrer para preservar o consumidor, garantindo que rações fora dos padrões estabelecidos não sejam comercializadas.

A aus ência de padr ões microbiol ógicos para alimentos para c ães e gatos dificulta a an âlise sobre o risco que os contaminantes biol ógicos possam representar à sa úde dos animais de companhia e humanos, j áque muitos pat ógenos s ão agentes zoon áticos (SOUZA, 2013). A legisla ção vigente no Brasil sobre o assunto é antiquada (MAPA) e mesmo padr ões estabelecidos por empresas privadas (ABINPET) ainda parecem desatualizados. Alguns limites est ão abaixo na Tabela 1.

Tabela 1. Limites para contaminantes microbiológicos segundo normas do MAPA e manual ABINPET.

An álises	Animais de produção. (MAPA, 2000)			Animais de companhia. (ABINPET, 2008)		
(UFC/g)	-Adequado	Accit ável	Inaccit ável	Adequado	Accit ável	Inaccit ável
Contagem total de mes éfilos/g	<10 ⁵	10 ⁵ - 10 ⁷	>108	NI	NI	NI
E. coli/ 25g Coliformes fecais	Ausente NI	Presente NI	Presente NI	Ausente <10	Ausente 10 – 10 ³	Presente >10 ⁴
Enterobact éri as/g	<10	10 - 10 ⁴	>10 ⁵	<10	$10 - 10^{3}$	>104
Salmonella/ 25g	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Presente
Fungos e leveduras/g	< 10	10 ³ - 10 ⁴	>10 ⁵	<10	10 – 10 ³	>104

Fonte: Adaptado MAPA (2000) e ABINPET (2008)

NI: Não informado.

Na análise de mes ófilos aer ófilos das amostras de ração vendidas a granel, houve crescimento em 95% (19) das amostras, em 60% das placas com a diluição de 10-3e, por fim, em 25% das placas com a diluição de 10-4, sendo produzidas geralmente colônias circulares, brancas ou amarronzadas, de tamanhos variados, de aspecto mucoide ou rizóide, fri áveis ou não, com bordas regulares ou irregulares. Em lâminas feitas, com a coloração de Gram, a partir de colônias selecionadas pode-se visualizar a presença de cocos e bastonetes, em diferentes arranjos, Gram-positivos em sua maioria. Das amostras que apresentaram crescimento a contagem m nima foi de 1,5 x 10 UFC/g e a m áxima de 1,625 x 10⁵ UFC/g, como mostra a Tabela 2.

De acordo com os resultados encontrados no experimento, houve contamina ção microbiana das ra ções vendidas a granel, foi constatado que a mesma étanto de car áter bacteriano quanto de car áter fúngico, resultado semelhante tamb ém foi encontrado por Capelli et al. (2016), no Rio Grande do Sul, onde encontrou 86,36% de contamina ção por mes ófilos aer ófilos e 90,9% por leveduras e bolores. O crescimento das col ônias apresentou uma redu ção progressiva ao passar das dilui ções mais para as menos concentradas, esse fato não garante a qualidade do produto, visto à possibilidade da presen ça de agentes patogênicos não identificados. Na contagem pelo método de plaqueamento em profundidade observamos que três amostras apresentaram entre 10 e 10 ²UFC/g, dez amostras apresentaram entre 10 e 10 ⁴UFC/g, três amostras ultrapassaram o limite considerado adequado pelo MAPA (>10⁵). Deve-se constatar que a amostra cinco não apresentou crescimento nas placas com PCA em nenhuma dilui ção, esse fato pode estar relacionado com a qualidade super-premium da ra ção e com o armazenamento adequado proporcionado pelo estabelecimento.

Segundo Girio (2007), a presen ça em maior número de bact érias mes ófilas em ra ções a granel pode ser explicada pelo tempo de exposi ção ao meio ambiente do produto quando de sua

formula ção. A presen ça de bact érias mes ófilas em ra ção em contagens aceit áveis (<10⁶ UFC/g) não representa risco para a sa úde animal, conforme relata Santos (2000).

Tabela 2. Resultados microbiológicos das contagens de mes ófilos aer ófilos, fungos e bolores e do crescimento de coliformes totais e termotolerantes.

Amostras	Contagem total de mes ófilos	Contagem total de leveduras e	Coliformes totais (NMP/g)	Coliformes termotolerantes
11	aer ófilos (UFC/g)	bolores (UFC/g)	$(m \acute{n} - m \acute{\alpha}x)$	(NMP/g) $(m \acute{n} - m \acute{\alpha}x)$
Controle	< 1	< 1	<3	<3
1	7 x 10	5 x 10	< 3	< 3
2	7,25 x 10	1×10^{4}	23 (4,6-94)	23 (4,6-94)
3	$2,25 \times 10^4$	< 1	< 3	< 3
4	$1,625 \times 10^5$	< 1	< 3	< 3
5	< 1	$2,5 \times 10^{2}$	< 3	< 3
6	$3,225 \times 10^{3}$	5 x 10 ³	< 3	< 3
7	$2,025 \times 10^{3}$	2,5 x 10	< 3	< 3
8	$1,325 \times 10^4$	5 x 10	< 3	< 3
9	1,5 x 10	5 x 10 ²	< 3	< 3
10	1 x 10 ³	5 x 10 ³	23 (4,6-94)	23 (4,6-94)
11	$6,25 \times 10^{3}$	5 x 10 ²	< 3	< 3
12	5,25 x 10 ²	7.5×10^{3}	< 3	< 3
13	2,5 x 10 ²	2 x 10 ²	23 (4,6-94)	23 (4,6-94)
14	1×10^4	$2,5 \times 10^{3}$	<3	<3
15	5 x 10 ²	1.5×10^4	<3	<3
16	$3,5 \times 10^{3}$	1.5×10^4	<3	<3
17	$1,45 \times 10^5$	5 x 10	<3	<3
18	2×10^{3}	3 x 10 ²	23 (4,6-94)	23 (4,6-94)
19	1.5×10^4	$3,5 \times 10^{2}$	3,6 (0,2-17)	<3
20	$1,41 \times 10^5$	2 x 10 ³	23 (4,6-94)	<3

UFC/g: Unidades formadoras de col ônia por grama.

NMP/g: Número mais provável por grama.

Outro fator que est á ligada a contamina ção bacteriana é a máqualidade higiênico-sanitária do ambiente onde a ração esteja sendo alocada e o ambiente externo a esse. Nos estabelecimentos onde foram efetuadas as coletas, pôde-se notar que a situação dos locais era condizente com o crescimento presente nas placas, visto que nesses era poss ível visualizar animais soltos próximos aos recipientes ou sacos de ração, recipientes das rações muitas vezes sujos, abertos e em locais inapropriados (ambiente próximo de frutas, carnes, gaiolas com aves, depósitos, dentre outros), máhigienização geral do estabelecimento, áreas que dão acesso da rua para a área interna da loja (buracos no teto, telhado e depósitos), recipientes de ração com crescimento fúngico macroscopicamente vis ível ou com manchas de gordura.

Na an álise de leveduras e bolores, por contagem pelo m étodo de plaqueamento em superf éie, houve crescimento em 90% (18) das amostras, na diluição de 10- \(\frac{1}{2}\) e em 30% dos casos, na diluição de 10- \(\frac{3}{2}\) sendo produzidas col ônias filamentosas circulares, de v ários tamanhos, brancas e brancas com a parte central esverdeada, com bordas regulares, tamb ém foram

produzidas col ônias leveduriformes circulares, pequenas, de colora ção branca ou avermelhada, com aspecto mucoide e bordas regulares. Em l âminas feitas, com a colora ção de Gram, a partir de col ônias selecionadas, pode-se visualizar a presen ça de hifas com colora ção azuladas, conidi óforos em diversos est ágios de desenvolvimento, e con filos arredondados dispersos. Das amostras que apresentaram crescimento a contagem m nima foi de $2,5 \times 10 \text{ UFC/g}$ e a m áxima de $1,5 \times 10^4 \text{ UFC/g}$, como apresentado na Tabela 2.

Tabela.3 Datas de validade, segmento comercial e espécie indicada pela ração.

Amostras Validade		Segmento Comercial - Esp écie	
Controle	Outubro/ 2019	Premium/ Adultos – C ão	
1	Novembro/ 2018	Premium/filhote – Gato	
2	Setembro/2018	Econ âmica/adulto - C ão	
3	Outubro/ 2018	Premium/adulto - Gato	
4	Janeiro/ 2019	Econ ômica/filhote - C ão	
5	Dezembro/ 2018	SP/castrado - Gato	
6	Mar ço/ 2019	Econ âmica/adulto - C ão	
7	Setembro/ 2018	Premium/filhote - Cão	
8	Novembro/ 2018	Econ ômica/adulto - Gato	
9	Novembro/ 2018	Premium/adulto - Gato	
10	Novembro/ 2018	Premium/filhote − C ão	
11	Outubro/ 2018	Econ âmica/adulto - Gato	
12	Dezembro/ 2018	Econ ômica/filhote – C ão	
13	Outubro/ 2019	Premium/ Adultos – Gato	
14	Janeiro/ 2020	Premium/ Adultos – Cão	
15	Setembro/2019	Premium/Filhotes – Gato	
16	Julho/ 2019	Premium/ Adultos – C ão	
17	Agosto/ 2019	Premium/ Filhotes - Gato	
18	Agosto/ 2019	Econ ômica/ Adulto – C ão	
19	Setembro/2019	Premium/ Filhotes − C ão	
20	Dezembro/ 2019	Econ ômica/ Adulto - Gato	

SP: Super-premium

O crescimento fúngico tamb ém apresentou redu ção progressiva no número de col ônias por placa, de acordo com o aumento do fator da dilui ção, da mesma forma este não garante a qualidade da ra ção, visto que existem fungos produtores de micotoxinas, e estas não são eliminadas do meio com a utiliza ção de técnicas comuns. Na contagem de fungos e bolores, realizada pelo método de plaqueamento em superf éie, observamos que quatro amostras apresentaram contagem entre 10 e 10 ²UFC/g, 11 apresentaram entre 10 ²e 10 ⁴ UFC/g e três amostras apresentaram contagem superior a 10 ⁴ UFC/g. Das amostras para fungos, 90% apresentaram contagem superior ao limite considerado adequado pelo MAPA e pela ABINPET, 15% das amostras ultrapassaram o limite considerado aceit ável pelo MAPA e inaceit ável pela ABINPET.

A contamina ção fúngica éum fato de extrema import ância na an âlise das ra ções a granel, pois os mesmos possuem grande resist ência e fácil veicula ção no ambiente, al ém de alguns serem produtores de micotoxinas, podendo estas permanecerem na ra ção ou nos locais

de armazenamento das mesmas. S ão menos exigentes que bact érias e leveduras em relação à umidade, pH, nutrientes e temperatura, sua presença, apesar de mais comum que as originadas por qualquer outro grupo de microrganismos, é importante n ão apenas sob o ponto de vista sensorial, mas tamb ém pelo fato de os bolores produzirem micotoxinas (algumas termoresistentes) com riscos àsa úde do consumidor (JAY, 2009).

Existem vários tipos de micotoxinas, como aflatoxinas, ocratoxinas, tricotecenos, zearalenona, fumonisinas, todas possuem alguma importância dentro da produção das rações, podendo contaminar as rações em diversas fases do processamento ou da venda. Em cães e gatos, os efeitos das micotoxinas são severos e podem levar à morte, al ém da perda de nutrientes, alteração das propriedades organol épticas e redução da validade do produto no mercado (CAMPOS, 2007). Alguns dos sinais cl nicos produzidos pelas micotoxinas são diminuição de apetite, diarreia, vômito, hemorragias, coagulopatias e possui propriedades carcinog ênicas.

Segundo estudo realizado no México, foi detectada a presença de aflatoxinas em 31 de 35 rações secas para cães e gatos testadas, apontando o risco iminente para os consumidores das mesmas (SHARMA & MÁRQUEZ, 2001). Os cães são animais particularmente sens veis aos efeitos hepatotóxicos agudos e a exposição regular às aflatoxinas que poderão causar dano crânico no f gado desses animais (MAIA & SIQUEIRA, 2007).

Na triagem para coliformes utilizando Caldo LST, na dilui ção 10- ¹foram observados tubos com turva ção e forma ção de g ás em 30% (6) das amostras analisadas, na dilui ção 10- ² 10% (2) foram positivas.

Das amostras que foram semeadas no Caldo VB todas apresentaram forma ção de bolha e turva ção do meio e n ão houveram tubos positivos nas dilui ções 10-3 nesse teste foi utilizada a técnica do Número Mais Prov ável para estimar a quantidade de coliformes totais por grama, onde a maior quantidade foi de 23 NMP (com m áximo de 94 e m nimo de 4,6) e a menor foi de 3,6 NMP (com m áximo de 17 e m nimo de 0,2), como pode-se ver na Tabela 2.

Das amostras testadas no Caldo EC, para a presen ça de coliformes termotolerantes, 70% (4) apresentaram turva ção do meio e forma ção de bolha nas dilui ções 10- ¹, nenhuma das dilui ções 10- ²foram consideradas positivas. Ap ós a coleta dos dados sobre os cultivos, foi determinado o número mais prov ável por grama de ra ção, sendo este de 23 NMP (com m áximo de 94 e m nimo de 4,6) para todas as amostras consideradas como positivas, como pode-se ver na Tabela 2.

Das 6 amostras que foram testadas para a presen ça de coliformes totais e termotolerantes, quatro apresentaram tubos positivos para os dois testes, duas foram positivas apenas para coliformes totais e uma foi positiva apenas para coliformes termotolerantes. Os resultados obtidos a partir das amostras em quest ão, nos mostram que cinco das amostras encontraram-se fora do padr ão adequado, uma para coliformes totais (MAPA e ABINPET) e quatro, tanto para coliformes totais, quanto pra coliformes termotolerantes (MAPA e ABINPET). Nesse quesito vale ressaltar que a legisla ção brasileira (MAPA) n ão apresenta informa ção sobre os padr ões para coliformes termotolerantes.

Desta forma foi considerado que 30% das amostras testadas para coliformes totais e termotolerantes apresentavam contamina ção, com esta podendo ser apenas por coliformes totais ou de ambos os grupos de coliformes.

Os coliformes totais e termotolerantes são de extrema importância para avalia ção sanitária de ra ções e alimentos em geral, visto que estes grupos contêm bactérias que são utilizadas como indicadores de qualidade higiênico-sanitária, as *Escherichia ssp.* e *Klebsiella*

ssp. s ão exemplos de bact érias inclu flas no grupo de coliformes fecais e que s ão utilizadas como indicadores de seguran ça alimentar. Grande parte da contamina ção que acomete animais de companhia est árelacionada com a ingest ão de alimentos que em sua formula ção contenham farinha de carne. Estimativas revelam que cerca de 50% das farinhas encontram-se contaminadas com *E. coli* (SOUZA, 2013).

Resultados semelhantes foram encontrados por Girio (2007), onde ao analisar 15 rações comercializadas a granel, no estado de São Paulo, 6,7% apresentaram contaminação por coliformes termotolerantes e 6,7% apresentavam contaminação por coliformes totais.




Figura 1. Porcentagem total de amostras positivas e que se apresentaram fora dos padrões MAPA e/ou ABINPET.

De maneira geral a contamina ção estava presente na grande maioria das ra ções, a contamina ção por mes ófilos aer ófilos atingiu 95% das amostras, 90% se apresentaram contaminadas por fungos e bolores, 20% das ra ções foram positivas quando avaliados a presen ça de coliformes totais e termotolerantes.

A contamina ção presente nas ra ções vendidas a granel pode ser explicada por falhas estruturais e de capacita ção, onde essas favorecem o aparecimento de portas de entrada para agentes contaminantes. Al ém desses, as caracter áticas de produ ção das ra ções aumentam o risco de contamina ção quando expostas ao ambiente externo a embalagem original.

CONCLUSÕES

A grande maioria das ra ções vendidas a granel apresentaram-se contaminadas por algum dos grupos de microrganismos avaliados. Em algumas ra ções observou-se contagens superiores aos padrões estabelecidos pelo MAPA e ABINPET, principalmente na an alise de leveduras e bolores (fungos).

A falta de uma legisla ção atualizada sobre o controle microbiol ógico de ra ções para animais de companhia dificulta as avalia ções e o controle da qualidade microbiol ógica das ra ções secas, tanto pelo fabricante quanto por algum laborat ório respons ável por estudo ou fiscaliza ção, al én de poder representar s érios riscos àsa úde animal.

As boas práticas de higiene no local de venda podem ajudar a reduzir a carga microbiana das rações, al ém disso, faz-se necess ário armazenar de forma mais adequada as rações vendidas a granel, como embalando-as individualmente (para diminuir a exposição ao ambiente externo) ou higienizando de maneira adequada o ambiente e recipiente, espec fico, da ração. Esses achados possuem import ância na saúde animal e na saúde pública.

REFERÊNCIAS

- 1. ABINPET. Associa ção Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estima ção. Manual do programa integrado de qualidade pet PIQPET. 2.ed. São Paulo, 2008. 238p.
- 2. ABINPET, 2017. Associa ção Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estima ção. Mercado Pet Brasil, Dispon vel em: http://www.http://abinpet.org.br/mercado acessado em 20/05/2019.
- 3. AMERICANO, M. M. S. Qualidade microbiol ógica de ra ção para c ães produzidas e comercializadas no Estado de Mato Grosso. 2016. Disserta ção (Mestrado em Bioci ência Animal) Universidade de Cuiab á Cuiab á MT, 2016.
- 4. ANDRADE, R.M. & NASCIMENTO, J.S. Presença de fungos filamentosos em ração para cão comercializadas na cidade de Pelotas RS. Arquivo do Instituto Biológico de São Paulo, São Paulo, v. 72, n. 2, p. 10-12, 2005.
- 5. BRASIL. Decreto-lei no 6296, de 11 de dezembro de 2007. D.O.U., Bras fia, 11 de dezembro de 2007.
- 6. BRASIL. MAPA. Normas e padrões de nutrição e alimentação animal. Bras fia: MA/SARC/DFPA. p. 12, 2000.
- 7. BRASIL. MAPA. Instrução Normativa n °62, de 26 de agosto de 2003. D.O.U., Bras fia, 26 de agosto de 2003.
- 8. CAMPOS, S.G. Monitoramento de aflatoxinas, fungos toxigênicos e níveis de contaminação em matérias-primas e alimentos balanceados Aflatoxicose natural em cães no Estado do Rio de Janeiro. Tese (Doutorado em Ciências Veterinárias) Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, 2007.
- 9. CAPPELLI, S., LUNEDO, P., FREITAS, C. P., RABER, H. R., MANICA, E., HASHIMOTO, J. H., OLIVEIRA, V. Avalia ção qu mica e microbiol ógica das ra ções secas para c ães e gatos adultos comercializadas a granel. Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal, v.10 n.1, 90-102p, 2016.
- 10. DOMINGUES, L. P. Fécula de Batata na alimentação de cães. 2016, Dissertação (Mestrado em Zootecnia), Universidade Federal do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, PR, 2016.
- 11. GIRIO, T. M. S., Qualidade microbiológica de rações para cães comercializadas no varejo em embalagem fechada e a granel. 2007, Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias), Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias Jaboticabal, SP, 2007.
- 12. HILLMANN, B. et al., An âlise microbiol ógica de ra ções para c ães comercializadas a granel e em embalagem fechada. Enciclop édia Biosfera, Goi ânia, v. 11, n. 21, p. 134, 2015.
- 13. JAY, J.M. Microbiologia de alimentos. 6. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- 14. MAIA, P. P.; SIQUEIRA, M. E. P. B., Aflatoxinas em rações destinadas a c ães, gatos e p ássaros Uma revis ão. Revista da FZVA, v. 14, n. 1, 2007.
- 15. SANTOS, E. J., CARVALHO, E. P., SANCHES, R. L., BARROS, B. E. B. Qualidade microbiol ógica de farinhas de carne e ossos produzidas no Estado de Minas Gerais para produ ção de ra ção animal. Ci ência Agropecu ária, Lavras, v.24, n.2, p.425-433, 2000.

- 16. SHARMA, M.; MÁRQUEZ, C. Determination of aflatoxins in domestic pet foods (dog and cat) using immunoaffinity column and HPLC. Animal Feed Science and Technology, v.93, p.109-114, 2001.
- 17. SILVA, N.; JUNQUEIRA, V. C. A.; SILVEIRA, N. F. A. Manual de m étodos de an álise microbiol ógica de alimentos e água. 5 ªed, S ão Paulo, Blucher, 1997.
- 18. SILVA, L.O.N. Sistema de qualidade (NB 9000) em fábricas de rações. 1998. Tese (Doutorado), Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Agr cola, 1998.
- 19. SILVA, A. K. da; DOMARESKI, J. L., Avalia ção da qualidade microbiol ógica de ra ções para c ães comercializadas no varejo de Foz do Igua çu/PR. Pleiade, Foz do Igua çu, v. 9, n. 9, p.7-32, 2011.
- 20. SOUZA, K. K. Rotulagem, qualidade e seguran ça biol ógica de alimentos para animais de companhia e seu impacto na sa úde. 2013, pag.232, Tese (Doutorado em Ci ências de Alimentos), Universidade Federal de Santa Catarina, Florian ópolis, SC, 2013.

ANEXO 1 - NORMAS DA REVISTA BRASILEIRA DE HIGIENE E SANIDADE ANIMAL - BRAZILIAN JOURNAL OF HYGIENE AND ANIMAL SANITY

Digita ção

O trabalho dever á ser digitado em tamanho A 4 210 x 297mm com, no máximo, 25 linhas por página em espa çamento entre linhas 1,5 linhas, com margens superior, inferior, esquerda e direita em 2,5cm, fonte Times New Roman e tamanho 12. O máximo de páginas ser á 15 para artigo cient fico, 20 para revis ão bibliográfica e 8 para nota, incluindo tabelas, gráficos e figuras.

Estrutura

O artigo cient fico dever á ser redigido obedecendo a seguinte ordem de estrutura: t fulo, title, autores, resumo (incluindo termos para indexa ção), abstract (incluindo index terms), introdu ção, material e m étodos, resultados e discuss ão, conclus ões, agradecimentos (opcional) e refer ências bibliogr áficas. Notas cient ficas n ão necessitam obedecer a estrutura do artigo, mas devem ter, obrigatoriamente, resumo (incluindo termos para indexa ção), title e abstract (incluindo index terms).

T fulo

Deve ser escrito com apenas a inicial mai úscula, em negrito e centralizado na página. A chamada de rodap é sem tra ços para identifica ção deve ser extra fla do t fulo, devendo constar informa ções sobre a natureza do trabalho (se extra flo de tese/disserta ção) e refer ências a institui ções colaboradoras. Os t fulos das demais se ções da estrutura dever ão ser escritos com apenas a inicial mai úscula, em negrito, localizados no in cio da linha.

Autores

Os nomes completos dever ão vir abaixo do t fulo, somente com a primeira letra mai úscula, um ap ós outro, separados por v ígula e centralizados na linha. Como chamada de rodap é na primeira p ágina, deve-se indicar, de cada autor, a forma ção acad âmica, institui ção onde trabalha e endere ço eletr ônico.

Resumo e abstract

Devem come çar com estas palavras, na margem esquerda, com apenas a inicial mai úscula, em negrito, contendo no máximo 250 palavras cada e entre três e cinco termos para indexa ção, os quais não devem constar no t fulo.

Cita ção de autores no texto

Ser ão feitas pelo sobrenome, com apenas a primeira letra em mai úscula, seguido do ano de publica ção. Cita ção com apenas um autor usar da seguinte forma: Santos (2002) ou (Santos,

2002); com dois autores, usar Pereira & Freitas (2002) ou (Pereira & Freitas, 2002); com três ou mais autores, usar Xavier et al. (1997) ou (XAVIER et al., 1997).

Tabelas

Ser ão denominadas de Tabela (em negrito), numeradas consecutivamente com algarismos ar ábicos, na parte superior. N ão usar linhas verticais. As linhas horizontais devem ser usadas para separar o t fulo do cabe çalho e este do conte údo, al ém de uma no final da tabela. Cada dado deve ocupar uma c élula distinta.

Figuras

Gráficos, fotografias ou desenhos levar ão a denomina ção geral de Figura (em negrito) sucedida de numera ção ar abica crescente e legenda na parte inferior. Para a prepara ção dos gráficos devese utilizar "softwares" compat íveis com "Microsoft Windows" ("Excel", "Power Point", "Harvard Graphics", etc.). Gráficos e figuras confecciona em 3 planilhas eletrânicas devem vir acompanhados do arquivo com a planilha original. Fotos e desenhos devem ser digitalizados; escaneados com 300 dpi, gravados em arquivo nos formatos TIF ou JPG e enviados em arquivos separados do arquivo de texto. Evitar tabelas e figuras com largura superior a 17 cm.

Agradecimentos

Logo ap ás as conclus ões poder ão vir os agradecimentos a pessoas ou instituições, em estilo s óbrio e claro, indicando as raz ões pelas quais os faz.

Refer ências Bibliogr áficas

Dever ão ser apresentadas em ordem alfab ética de autores e numeradas de acordo com a NBR 6032 de agosto/2000 da ABNT e conter os nomes de todos os autores. As refer ências s ão utilizadas para convencer o leitor acerca da validade dos fatos e argumentos apresentados. Quando adequadamente escolhidas, fornecem maior credibilidade ao trabalho. Observa ção: deve-se priorizar a cita ção de refer ências atualizadas, ou seja, publicadas nos últimos cinco anos, considerando o momento da submiss ão do manuscrito. Devem ser citadas de peri ódicos cient ficos indexados em bases de dados nacionais e internacionais que foram consultadas na íntegra pelo autor e que tenham rela ção direta, relevante com o assunto abordado; não incluir na lista refer ências que não possam ser recuperadas no original pelo leitor, como teses e disserta ções, trabalhos de conclus ão de curso e outras fontes inacess veis (apostilas, anais etc.) ou obras de reduzida express ão cient fica. A atualidade da refer ência, isto é a cita ção de obras recentes, com menos de cinco anos, é essencial em artigos originais; as refer ências a artigos publicados em peri ódicos latino-americanos e que possuem vers ão em ingl ês, dever ão ser citadas com o t fulo em ingl ês; não incluir mais de 20 refer ências e menos de 15. Todas enumeradas. Veja alguns detalhes citados abaixo.

Alguns exemplos:

Livro

DOMINGUES, P.F., LANGONI, H. Manejo Sanit ário Animal. 1th ed. Rio de Janeiro: EPUB, 2001. 210p.

FORTES, E. Parasitologia veterin ária. 3a.ed. São Paulo: Éone. 686p. GEORGI, J.R. Parasitologia veterin ária. 4a. ed. São Paulo: Manole, 1988. 379p.

Cap fulo de livro

AKIBA, M.; TANIKAWA, E.; FUJII, Y. Volatile basic nitrogen (VBN) as a freshness Indicator of fish for canning. In: FAO Tecnical conference of fish inspection and quality control, 1st, Halifax, 1969. 4 p. (FE: FJC/69/0/52).

Tese/disserta ção

PINHEIRO, R.R. V rus da Artrite encerálica caprina. Desenvolvimento e padroniza ção de ensaios imunoenzim áticos (ELISA e Dot-Blot) e estudo epidemiológico no Estado 4 do Ceará Belo Horizonte, 2001. 115p. Tese (Doutorado em Ciência Animal) –Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais, MG, 2001.

Artigo de revista

CALLADO, A.K.C.; CASTRO, R.S.; TEIXEIRA, M.F.S. Lentiv fus de pequenos ruminantes(CAEV e Maedi-Visna): revis ão e perspectivas. Pesquisa Veterin ária Brasileira, Vi çosa, v.3, n.21, p.87-97, jan. 2001.

Resumo de trabalho de congresso

SALES, R.O. & DE OLIVEIRA, A.C. Compara ção entre cromatografia gasosa e de troca i ônica para avalia ção da qualidade nutricional da prote na da silagem da despesca da til ápia do Nilo. In: XV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 150., 1996, Po ços de Caldas - Minas Gerais, Anais...Po ços de Caldas: SBCTA, 1996. p.

Trabalho de congresso pela Internet

SILVA, R.N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedag ógicos do paradigma da qualidade total na educa ção. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENT FICA DA UFPE, 4., 1996, Recife. Anais eletr ônicos... Recife: UFPE, 1996. Dispon vel em . Acesso em: 21 jan. 1997.

Trabalho de congresso em CD

CANDIDO, M.J.D.; BENEVIDES, I.I.; FARIAS, S.F. et al. Comportamento de ovinos em pastagem irrigada sob lota ção rotativa com tr ês per ódos de descanso. In: REUNI ãO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 41, 2004, Campo Grande, Anais...Campo Grande: SBZ/EMBRAPA Gado de Corte, 2004, (CD -ROMAMB 055).